


Tårevejsundersøgelse i lokal bedøvelse



Undersøgelsen foregår i lokal bedøvelse, idet der lægges en bedøvende blokade i området omkring næseroden. Herefter bliver tårevejene åbnet, gennemskylllet, rensset, og eventuelt udblokket.

Der er tale om en undersøgelse, og ikke en operation. Selvom der nogle gange kan skaffes bedre afløb i en periode, er hovedformålet med undersøgelsen at skaffe information om pladsen i tårevejene.

Undersøgelsen foregår ambulant og varer ca. 20 minutter. Man kan tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Man vil ikke selv kunne køre bil efter undersøgelsen pga. hævelse og eventuel blødning.

Lige efter undersøgelsen kan der forekomme ømhed i øjenkrogen og hævelse og blåfarvning af huden i området. Næseblod kan forekomme, og man kan opleve midlertidigt dobbeltsyn. Man kan i nogle tilfælde opleve forværring af tåreflodet i en periode pga. hævelse.

Efter undersøgelsen skal øjet/øjnene dryppes med øjendråber mod hævelse og betændelse 3 gange dagligt i 2 uger. Dråberne skal du hente på apoteket. Evt. kontroltid efter 2-3 måneder.